



СЕФАГРАИН ТАБЛЕТКИ (CEPHAGRAINE, CHARAK PHARMA)

SKU: 1340

Цена: 95 грн

Сефаграин обеспечивает эффективное облегчение при скоплении слизи и закупорке, имеет болеутоляющее и противовоспалительное действие, уменьшает тошноту и беспокойство, связанное с мигренью. Снимающее застойные явления средство и анальгетик при синусите и мигрени.

Категория: Респираторная система

СЕФАГРАИН (CEPHAGRAINE, CHARAK PHARMA), 40 ТАБЛЕТОК

Сефаграин обеспечивает эффективное облегчение при скоплении слизи и закупорке, имеет болеутоляющее и противовоспалительное действие, уменьшает тошноту и беспокойство, связанное с мигренью. Снимающее застойные явления средство и анальгетик при синусите и мигрени.

Приём таблеток Сефаграин (Cephagrain) сужает черепные артерии и таким образом, уменьшает частоту, резкость и продолжительность мигрени. Также устраняет связанные с мигренью симптомы, такие как головная боль, тошнота, рвота, звон в ушах и т.д.

При синусите капли Сефаграин снимают воспаление, разжижают слизь и уменьшают застойные явления.

Показания: синдром мигрени, головная боль, синусит.

Таблетки Сефаграин лучше всего использовать одновременно с каплями Сефаграин.

Полезные результаты:

- уменьшает скопление слизи носа и таким образом уменьшает выделения из носа;
- обеспечивает эффективное облегчение при скоплении слизи и закупорке и дает лёгкое дыхание;
- имеет болеутоляющее и противовоспалительное действие, и таким образом уменьшает связанную с мигренью головную боль и напряжение;
- уменьшает тошноту и уменьшает беспокойство, связанное с мигренью;
- уменьшает частоту и продолжительность приступов мигрени;
- предотвращает скопление слизи и блокировку носовой впадины.

Что лучше делать при лечении, а чего стоит избегать:

Рекомендуется:

- рекомендуется потребление молока коровы и топленого масла для людей, страдающих от мигрени;
- очень полезно рано ложиться спать;
- потребление куркумы, чеснока, имбиря и черного перца рекомендуется для людей, страдающих от синусита;



- предпочитайте лёгкую диету (синусит).

Не рекомендуется:

- избегайте жареной и острой пищи;
- избегайте продуктов питания, которые вызывают расстройство желудка и запор;
- избегайте подвергаться чрезмерной высокой температуре, холоду, дождю и пыли;
- избегайте спать днём, и бессонных ночей;
- избегайте творога, бананов и высушенных продуктов (синусит);
- избегайте пить холодную воду и мороженое (синусит);
- избегайте нерегулярных диетических привычек (синусит).