



ИСАБГОЛ ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ (DOUBLE ACTION ISABGOL, DABUR) 100 ГРАММ

SKU: 3702

Цена: 303 грн

Действие Исабгола обусловлено высоким содержанием полисахаридов клетчатки, которые обладают выраженной гидрофильностью, формируют гель. Проходя по желудочно-кишечному тракту, гелевая масса работает по типу молекулярной "губки", нормализует и гомогенизирует внутреннюю среду кишечника, сорбирует токсины и газы, активно снижает боли и вздутие живота.

Категория: Аюрведические препараты, Очищение организма, Фитопрепараты

ИСАБГОЛ ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ (NATURECARE DOUBLE ACTION ISABGOL, DABUR)

Исабгол – аюрведический регулятор работы кишечника и пищеварительного тракта. Сверхмягкий препарат. Облегчает деятельность кишечного тракта, обеспечивает здоровый стул. Производится из натурального экологически чистого сырья, полученного путем переработки шелухи семян растения *Plantago ovata*. Этот вид произрастает только на ограниченных территориях Индии и Ближнего Востока и используется местным населением с незапамятных времен.

Действие Исабгола обусловлено высоким содержанием полисахаридов клетчатки, которые обладают выраженной гидрофильностью, формируют гель. Проходя по желудочно-кишечному тракту, гелевая масса работает по типу молекулярной "губки", нормализует и гомогенизирует внутреннюю среду кишечника, сорбирует токсины и газы, активно снижает боли и вздутие живота.

Клетчатка Исабгол - источник растворимых волокон. Она не расщепляется, не имеет питательной ценности, способствует снижению всасывания жиров, замедляет опорожнение желудка, тем самым способствует нормализации жирового обмена и снижению веса. Исабгол эффективно снижает всасывание общего и ЛПНП-холестерина, желчных кислот и глюкозы, уменьшая ее пиковую концентрацию в крови. Повышение экскреции азота с фекалиями, под действием препарата, активно снижает уровень мочевины в плазме.

Показания для применения:

- запоры;
- избыточный вес и ожирение (в комплексе с другими препаратами);
- интоксикации, (в том числе алкогольные);
- повышенный холестерин;
- дисфункция кишечника;
- геморрой (во избежание болезненных дефекаций);
- послеоперационный период;
- хронический понос;



- условия, при которых легкая дефекация с мягким стулом является желательной (например, геморрой, анальные трещины или в течение беременности), цистит, понос, дивертикулез, дизентерия, гиперхолестеролемиа, синдром раздражительной кишки.

Способ применения:

Принимать внутрь по 1 чайной ложке (5 грамм) перед сном для взрослых и детей старше 12 лет. Курс лечения: не больше 8-10 дней.

Противопоказания:

беременность, период лактации, сужения желудочно-кишечного тракта, непроходимость кишечника, сахарный диабет с затрудненным регулированием инсулином, боли в животе, каловый завал.

Лекарственные взаимодействия:

Люди с инсулинзависимым диабетом могут требовать меньшего количества инсулина. Употребляйте подорожник через один час после потребления других лекарств. Может воздействовать на тонкокишечное поглощение других лекарств, принятых одновременно. Когда принимается одновременно, образующее объем слабительное может замедлять поглощение других лекарств (например, аспирин, сердечных гликозидов, антибиотиков, противосвертывающих средств, и т. д.) и диетических питательных веществ (например, кальция, железа, цинка, натрия, калия, и т. д.). Может противодействовать противопносным средствам. Благодаря гипотензивному действию этой травы следующие взаимодействия возможны: когда принимается с обезболивающими средствами, увеличен гипотензивный результат; потенцирование гипотензивных средств; когда принимается с мочегонными, трудность с диурезом и артериальной гипертензией может иметь место; антагонизм с симпатомиметиками.

Побочные эффекты:

Случайный метеоризм, редкие случаи аллергии и анафилаксии.

Предупреждение:

Не превышайте 8-10 дней лечения. Тонкокишечное поглощение лекарств, принятых одновременно может быть уменьшенным. Фитобезоары (пищевой шар, который формируется, блокируя желудочно-кишечный тракт) может формироваться, если не принимается с достаточным количеством жидкости. Благодаря формирующим объем волокнам и слизи, найденных в этом материале, принимая внутрь это без адекватного количества жидкости, может причинять разбухание, блокируя пищевод, и причиняя удушье. Этот материал должен применяться с, по крайней мере, 250 мл воды или другой жидкости (принятый без достаточного количества жидкости, может причинять удушье).

Внимание! Во время приема Исабгола необходимо выпивать в течение дня 6-8 стаканов чистой воды (не кипяченой).

Состав препарата:

Isabgol 49 g. *Plantago ovata* или *Plantago ispagula*. Подорожник Французский (Азиатский). Это травянистое растение из рода Подорожник, которое произрастает в Индии и Иране. В препарате используется эпидермис и разрушенные смежные слои, удаленные из высушенных зрелых зерен. Amla 1.0 g.

Консервант: Sodium Methyl Paraben, sodium Propyl Paraben.

Химические и питательные вещества: кальций, углеводы (85 %), жиры (3,5 %), железо, фосфор, белок (1,5 %).

РОСА-ФАРМ. Аюрведичні препарати преміум класу.
Київ, вул. Михайлівська, 24-А. Відкрито з 10:00 до 18:00 щодня.
Телефони: +380932173134, +380670070108, +380671600108.



Срок годности: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Производство: Индия, Дабур