



## ЦИСТОН (CYSTONE, HIMALAYA HERBALS) 60 ТАБЛЕТОК

**SKU:** 2049

**Цена:** 295 грн

Препарат регулирует кристалло-коллоидный баланс при дисметаболической нефропатии, снижает концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций, гидроксипролин). Повышает уровень элементов, которые ингибируют процесс образования камней (натрий, магний, калий). Воздействуя на муцин, препарат способствует дезинтеграции камней, приводит к их деминерализации.

**Категория:** Аюрведические препараты, Мочевыделительная система, Фитопрепараты

## ЦИСТОН (CYSTONE, HIMALAYA HERBALS)

Цистон - комбинированный растительный препарат. Оказывает диуретическое, спазмолитическое, литолитическое, противомикробное и противовоспалительное действие.

Препарат регулирует кристалло-коллоидный баланс при дисметаболической нефропатии, снижает концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций, гидроксипролин). Повышает уровень элементов, которые ингибируют процесс образования камней (натрий, магний, калий). Воздействуя на муцин, препарат способствует дезинтеграции камней, приводит к их деминерализации.

Препятствует аккумуляции частиц вокруг ядра камня, что предотвращает его дальнейший рост.

Стимулируя диурез и расслабляя гладкую мускулатуру мочевого тракта, Цистон способствует выведению оксалатных и фосфатных солей, мочевой кислоты и мелких камней из мочевыводящих путей.

Цистон оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие, особенно в отношении *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* и других грамотрицательных бактерий.

Литолитический эффект препарата не зависит от pH мочи.

### **Показания для Цистон:**

- мочекаменной болезни;
- кристаллурии;
- инфекций мочевыводящих путей (циститы, пиелонефриты);
- подагры.

### **Состав Цистон:**

#### **Активные компоненты:**

- *Didymocarpus pedicellata* (цветы)
- *Saxifraga ligulata* (стебли) - 49 мг
- *Rubia cordifolia* (стебли) - 16 мг



- Cyperus scariosus (корневища) – 16 мг
- Achyranthes aspera (семена) – 16 мг
- Onosma bracteatum (надземная часть растения) – 16 мг
- Vernonia cinerea (цельное растение) – 16 мг
- Hajrul yahood bhasma (порошок извести кремниевой) – 16 мг
- Shilajeet purified (смола очищенная минеральная) – 13 мг

*Неактивные компоненты:* стеарат магния, кросповидон, микрокристаллическая целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия, аэросил (диоксид кремния коллоидный).

### **Применение:**

Таблетки Цистон предназначены для внутреннего применения.

Для литолиза конкрементов, образованных уратами и мочевой кислотой (фосфатные и оксалатные камни): детям более 14 лет и взрослым – по 2 таблетки, с 6 до 14 лет – по 1 таблетке, с 2 до 6 лет – по ½ таблетке на прием. Назначается 3 раза в день, после еды. Длительность лечения – 3-4 месяца. Затем продолжают терапию в дозах: детям более 14 лет и взрослым – по 1 таблетке, с 6 до 14 лет – по ½ таблетки, с 2 до 6 лет – по ¼ таблетки. Препарат назначается 2 раза в день. Терапия продолжается до момента выведения из организма камней (песка).

При профилактическом назначении для предотвращения образования конкрементов: по 1 таблетке, с 6 до 14 лет – по 1/2 таблетки, с 2 до 6 лет – по ¼ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день на протяжении 4-5 месяцев.

Для лечения инфекций мочевыводящих путей: детям с 14 лет и взрослым – по 2 таблетки, с 6 до 14 лет – по 1 таблетке, с 2 до 6 лет – по ½ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день.

Курс лечения – 4-6 недель. При рецидивирующих формах заболевания: детям с 14 лет и взрослым – по 1 таблетке, с 6 до 14 лет – по 1/2 таблетки, с 2 до 6 лет – по ¼ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день. Курс лечения – 6-12 недель.

В случае почечной колики (острой): детям с 14 лет и взрослым – по 2 таблетки, с 6 до 14 лет – по 1 таблетке, с 2 до 6 лет – по ½ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день до купирования симптомов.

**Противопоказания:** аллергические реакции на компоненты Цистона.

**Побочные действия:** Редко – реакции индивидуальной непереносимости.

Беременность: Препарат может назначаться кормящим матерям и беременным женщинам.

### **Дополнительно:**

Препарат не рекомендуется назначать пациентам с непроходимостью мочевыводящих путей вследствие большого размера конкрементов (более 10 мм в диаметре по данным дополнительных методов исследования). При развитии интенсивного болевого синдрома на фоне приема следует прекратить лечение Цистоном. Действие препарата развивается постепенно, что следует учитывать при назначении.

**Внимание!** Перед применением препарата Цистон вы должны проконсультироваться с врачом. Данная инструкция приведена в свободном переводе и предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации просим обращаться к аннотации производителя.