



ЦИСТОН (CYSTONE, HIMALAYA HERBALS) 60 ТАБЛЕТОК

SKU: 2049

Цена: 295 грн

Препарат регулирует кристалло-коллоидный баланс при дисметаболической нефропатии, снижает концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций, гидроксипролин). Повышает уровень элементов, которые ингибируют процесс образования камней (натрий, магний, калий). Воздействуя на муцин, препарат способствует дезинтеграции камней, приводит к их деминерализации.

Категория: Фитопрепараты, Аюрведические препараты, Мочевыделительная система

ЦИСТОН (CYSTONE, HIMALAYA HERBALS)

Цистон - комбинированный растительный препарат. Оказывает диуретическое, спазмолитическое, литолитическое, противомикробное и противовоспалительное действие.

Препарат регулирует кристалло-коллоидный баланс при дисметаболической нефропатии, снижает концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций, гидроксипролин). Повышает уровень элементов, которые ингибируют процесс образования камней (натрий, магний, калий). Воздействуя на муцин, препарат способствует дезинтеграции камней, приводит к их деминерализации.

Препятствует аккумуляции частиц вокруг ядра камня, что предотвращает его дальнейший рост.

Стимулируя диурез и расслабляя гладкую мускулатуру мочевого тракта, Цистон способствует выведению оксалатных и фосфатных солей, мочевой кислоты и мелких камней из мочевыводящих путей.

Цистон оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие, особенно в отношении *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* и других грамотрицательных бактерий.

Литолитический эффект препарата не зависит от pH мочи.

Показания для Цистон:

- мочекаменной болезни;
- кристаллурии;
- инфекций мочевыводящих путей (циститы, пиелонефриты);
- подагры.

Состав Цистон:

Активные компоненты:

- *Didomocarpus pedicellata* (цветы)
- *Saxifraga ligulata* (стебли) - 49 мг
- *Rubia cordifolia* (стебли) - 16 мг



- Cyperus scariosus (корневища) - 16 мг
- Achyranthes aspera (семена) - 16 мг
- Onosma bracteatum (надземная часть растения) - 16 мг
- Vernonia cinerea (цельное растение) - 16 мг
- Hajrul yahooo bhasma (порошок извести кремниевой) - 16 мг
- Shilajeet purified (смола очищенная минеральная) - 13 мг

Неактивные компоненты: стеарат магния, кросповидон, микрокристаллическая целлюлоза, карбоксиметилцеллюлоза натрия, аэросил (диоксид кремния коллоидный).

Применение:

Таблетки Цистон предназначены для внутреннего применения.

Для литолиза конкрементов, образованных уратами и мочевой кислотой (фосфатные и оксалатные камни): детям более 14 лет и взрослым – по 2 таблетки, с 6 до 14 лет – по 1 таблетке, с 2 до 6 лет – по ½ таблетке на прием.

Назначается 3 раза в день, после еды. Длительность лечения – 3-4 месяца. Затем продолжают терапию в дозах: детям более 14 лет и взрослым – по 1 таблетке, с 6 до 14 лет – по ½ таблетки, с 2 до 6 лет – по ¼ таблетки.

Препарат назначается 2 раза в день. Терапия продолжается до момента выведения из организма камней (песка).

При профилактическом назначении для предотвращения образования конкрементов: по 1 таблетке, с 6 до 14 лет – по 1/2 таблетки, с 2 до 6 лет – по ¼ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день на протяжении 4-5 месяцев.

Для лечения инфекций мочевыводящих путей: детям с 14 лет и взрослым – по 2 таблетки, с 6 до 14 лет – по 1 таблетке, с 2 до 6 лет – по ½ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день.

Курс лечения – 4-6 недель. При рецидивирующих формах заболевания: детям с 14 лет и взрослым – по 1 таблетке, с 6 до 14 лет – по 1/2 таблетки, с 2 до 6 лет – по ¼ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день. Курс лечения – 6-12 недель.

В случае почечной колики (острой): детям с 14 лет и взрослым – по 2 таблетки, с 6 до 14 лет – по 1 таблетке, с 2 до 6 лет – по ½ таблетки на прием. Препарат назначается 3 раза в день до купирования симптомов.

Противопоказания: аллергические реакции на компоненты Цистона.

Побочные действия: Редко – реакции индивидуальной непереносимости.

Беременность: Препарат может назначаться кормящим матерям и беременным женщинам.

Дополнительно:

Препарат не рекомендуется назначать пациентам с непроходимостью мочевыводящих путей вследствие большого размера конкрементов (более 10 мм в диаметре по данным дополнительных методов исследования). При развитии интенсивного болевого синдрома на фоне приема следует прекратить лечение Цистоном. Действие препарата развивается постепенно, что следует учитывать при назначении.

Внимание! Перед применением препарата Цистон вы должны проконсультироваться с врачом. Данная инструкция приведена в свободном переводе и предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации просим обращаться к аннотации производителя.