

НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА МЕДОК 25 МЛ

SKU: 0006
Цена: 128 грн

Настойка прополиса Медок — 10%-й спиртовой раствор прополиса (пчелиного клея). Содержит природные фенольные соединения, флавоноиды и антиоксиданты. Применяется наружно (кожа, слизистые полости рта, горла, носа) и внутрь по рекомендации врача.

Категория: Иммунитет и защита

НАСТОЙКА ПРОПОЛИСА МЕДОК, 10%, 25 МЛ

Настойка прополиса Медок — 10%-й спиртовой раствор прополиса (пчелиного клея). Содержит природные фенольные соединения, флавоноиды и антиоксиданты прополиса в удобной жидкой форме. Применяется наружно и внутрь. Продукт натуральный: при хранении возможно выпадение осадка — это норма. Настойка имеет тёмно-коричневый цвет, специфический запах и горьковатый вкус.

Ключевые ингредиенты:

- **Прополис (10%)** — натуральный продукт пчеловодства. Содержит фенольные соединения, флавоноиды (пиноцембрин, хризин, кемпферол), эфирные масла и природные антиоксиданты. Традиционно используется в народной медицине для поддержки местного комфорта слизистых оболочек и кожи, а также для поддержки естественных защитных функций организма.

Способ применения:

Наружно: наносить на поражённые участки кожи 2–3 раза в день. Для полоскания полости рта и горла: 30–40 капель растворить в 100 мл тёплой воды; использовать 2–3 раза в день. Для промывания носовых ходов: смешать с физиологическим раствором в соотношении 1:10. При дискомфорте в ухе: вводить смоченный ватный тампон в наружный слуховой проход или закапывать 1–2 капли 3–4 раза в день.

Внутрь: 15 капель растворить в 100 мл воды, молока или чая. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не превышать 20 капель за один приём.

Целесообразность применения определяет врач.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость прополиса, спирта или продуктов пчеловодства. Не применять внутрь при беременности и в период кормления грудью (наружное применение — по рекомендации врача). Не применять внутрь детям до 12 лет. С осторожностью при атонической бронхиальной астме, поллинозе, аллергическом рините, крапивнице, экземе, дерматите. Не применять при кровоточащих ранах и поражениях кожи. При заболеваниях печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей и почек — только после консультации с врачом. При одновременном приёме лекарственных препаратов проконсультируйтесь с врачом относительно возможного

взаимодействия.

Перед первым применением рекомендуется провести тест на переносимость: нанести небольшое количество настойки на кожу или слизистую. При появлении раздражения или ухудшения самочувствия — прекратить применение.

Возможные нежелательные реакции:

При нарушении рекомендуемой дозировки возможны: снижение аппетита, вялость, аллергические реакции, повышение температуры. При появлении любых нежелательных реакций — прекратить применение и обратиться к врачу.

Условия хранения: Хранить в защищённом от света месте, вдали от детей.

Состав: Прополис 10%, водно-спиртовой раствор.

*Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.