



ЭУКАРБОН (EUCARBON, SEDICO) 30 ТАБЛЕТОК

SKU: 1095

Цена: 100 грн



Эукарбон содержит растительные и минеральные активные ингредиенты. Препарат проявляет мягкое слабительное и ветрогонное действие благодаря содержанию листьев сенны и экстракта ревеня. Наличие эфирных масел мяты перечной и фенхеля усиливает ветрогонный и противовоспалительный эффект действующих веществ. Наличие древесного угля способствует связыванию токсинов различного происхождения. Препарат проявляет дезинфицирующее и противовоспалительное действие в ЖКТ.

Категория: Очищение организма, Пищеварительная система

ЭУКАРБОН (EUCARBON, SEDICO) СЛАБИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Эукарбон содержит растительные и минеральные активные ингредиенты. Препарат проявляет мягкое слабительное и ветрогонное действие благодаря содержанию листьев сенны и экстракта ревеня. Наличие эфирных масел мяты перечной и фенхеля усиливает ветрогонный и противовоспалительный эффект действующих веществ. Наличие древесного угля способствует связыванию токсинов различного происхождения. Препарат проявляет дезинфицирующее и противовоспалительное действие в ЖКТ.

Слабительный эффект наступает через 8-10 ч после приема. Есть данные о положительном клиническом опыте применения препарата у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Показания: запор различного происхождения.

Применение: таблетки принимать во время или после еды: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 1-2 таблетки до 3 раз в сутки до достижения мягкого слабительного эффекта. Если необходимо более сильное слабительное действие, то вечерняя доза может быть повышенена до 3-4 таблеток Эукарбона.

Продолжительность курса зависит от характера и тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально. Продолжительность среднего курса — 2 нед.

Противопоказания: повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Острая кишечная непроходимость, острые инфекционные заболевания кишечника, боль в животе неизвестного происхождения. Нарушение водного и электролитного баланса. Возраст младше 12 лет.

Побочные эффекты: при приеме препарата в рекомендуемых дозах побочные эффекты отмечают очень редко (неприятные ощущения в животе, связанные с диареей). При применении антрахидоновых слабительных средств описаны случаи развития тошноты и рвоты центрального генеза; данный эффект могут вызывать сенна и ревень. Прием препарата в высоких дозах в течение длительного периода может вызвать снижение уровня электролитов (в основном калия) в плазме крови и обусловить замедление пассажа кишечного содержимого.

В связи со щелочной реакцией может наблюдаться непродолжительная слабая окраска мочи в красный цвет, что не



имеет клинического значения.

Особые указания: для достижения необходимого терапевтического эффекта доза препарата подбирается индивидуально.

Развитие диареи является симптомом передозировки. Длительность применения препарата — не менее 7 дней и не более 14 дней. Не рекомендуется применять в качестве средства для похудения. При длительном применении эффект препарата может снижаться.

Каждая таблетка Эукарбона содержит 43,4 мг сахарозы. Препарат можно применять у больных сахарным диабетом. Не рекомендуется применение препарата пациентам с непереносимостью фруктозы и галактозы, с синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, с недостаточностью сахаразы-изомальтазы.

Период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применение препарата в указанный период. Способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. Не влияет.

Взаимодействия: при одновременном применении препарата с сердечными гликозидами и развитии гипокалиемии эффект сердечных гликозидов повышается.

Передозировка: симптомы: развитие диареи. Необходимо прекратить применение препарата или снизить его дозу.