



## ІСАБГОЛ ПОДВІЙНА ДІЯ (NATURECARE DOUBLE ACTION ISABGOL, DABUR) 100 ГРАМ

SKU: 3702

Ціна: 303 грн

Дія Ісабгола обумовлена високим вмістом полісахаридів клітковини, які мають виражену гідрофільність, формують гель. Проходячи шлунково-кишковим трактом, гелева маса працює за типом молекулярної "губки", нормалізує та гомогенізує внутрішнє середовище кишечника, сорбує токсини та гази, активно знижує болі та здуття живота.

**Категорія:** Аюрведичні препарати, Очищення організму, Фітопрепарати

## ІСАБГОЛ ПОДВІЙНА ДІЯ (NATURECARE DOUBLE ACTION ISABGOL, DABUR)

Ісабгол – аюрведичний регулятор роботи кишечника та травного тракту. Надм'який препарат. Полегшує діяльність кишечника, забезпечує здорове випорожнення. Виготовляється з натуральної екологічно чистої сировини, одержаної шляхом переробки лушпиння насіння рослини *Plantago ovata*. Цей вид росте лише на обмежених територіях Індії та Близького Сходу і використовується місцевим населенням з давніх-давен.

Дія Ісабгола обумовлена високим вмістом полісахаридів клітковини, які мають виражену гідрофільність, формують гель. Проходячи шлунково-кишковим трактом, гелева маса працює за типом молекулярної "губки", нормалізує та гомогенізує внутрішнє середовище кишечника, сорбує токсини та гази, активно знижує болі та здуття живота.

Клітковина Ісабгол - джерело розчинних волокон. Вона не розщеплюється, не має поживної цінності, сприяє зниженню всмоктування жирів, уповільнює спорожнення шлунка, тим самим сприяє нормалізації жирового обміну та зниження ваги. Ісабгол ефективно знижує всмоктування загального та ЛПНЩ-холестерину, жовчних кислот та глюкози, зменшуючи її пікову концентрацію в крові. Підвищення екскреції азоту з фекаліями під дією препарату активно знижує рівень сечовини в плазмі.

### Показання для застосування:

- запори;
- надмірна вага та ожиріння (у комплексі з іншими препаратами);
- інтоксикації (у тому числі алкогольні);
- підвищений холестерин;
- дисфункція кишківника;
- геморої (щоб уникнути хворобливих дефекацій);
- післяопераційний період;
- хронічний пронос;
- умови, при яких легка дефекація з м'яким випорожненням є бажаною (наприклад, геморої, анальні тріщини або протягом вагітності), цистит, пронос, дивертикулез, дизентерія, гіперхолестеролемія, синдром дратівливої кишки.



### **Спосіб застосування:**

Приймати внутрішньо по 1 чайній ложці (5 грам) перед сном для дорослих та дітей віком від 12 років. Курс лікування: не більше ніж 8-10 днів.

### **Протипоказання:**

вагітність, період лактації, звуження шлунково-кишкового тракту, непрохідність кишечника, цукровий діабет із утрудненим регулюванням інсуліном, біль у животі, каловий завал.

### **Лікарські взаємодії:**

Люди з інсулінзалежним діабетом можуть вимагати меншої кількості інсуліну. Вживайте подорожник через годину після споживання інших ліків. Може впливати на тонкокишкове поглинання інших ліків, які прийняті одночасно. Коли приймається одночасно, що утворює об'єм проносне може уповільнювати поглинання інших ліків (наприклад, аспірину, серцевих глікозидів, антибіотиків, протизгортаючих засобів, і т. д.) і дієтичних поживних речовин (наприклад, кальцію, заліза, цинку, натрію, калію, тощо) д.). Може протидіяти протипоносних засобів. Завдяки гіпотензивній дії цієї трави наступні взаємодії можливі: коли приймається із знеболюючими засобами, збільшено гіпотензивний результат; потенціювання гіпотензивних засобів; коли приймається з сечогінними, труднощі з діурезом та артеріальною гіпертензією може мати місце; антагонізм із симпатоміметиками.

### **Побічні ефекти:**

Випадковий метеоризм, рідкісні випадки алергії та анафілаксії.

### **Попередження:**

Не перевищуйте 8-10 днів лікування. Тонкокишкове поглинання ліків, прийнятих одночасно може бути зменшеним. Фітобесоари (харчова куля, яка формується, блокуючи шлунково-кишковий тракт) може формуватися, якщо не приймається з достатньою кількістю рідини. Завдяки формуючим об'єм волокнам і слизу, знайдених у цьому матеріалі, приймаючи всередину це без адекватної кількості рідини, може завдавати розбухання, блокуючи стравохід, та завдаючи ядуху. Цей матеріал повинен застосовуватися з принаймні 250 мл води або іншої рідини (прийнятий без достатньої кількості рідини, може завдавати ядухи).

**Увага!** Під час прийому Ісабгол необхідно випивати протягом дня 6-8 склянок чистої води (не кип'яченої).

### **Склад препарату:**

Isabgol 49 г. Plantago ovata або Plantago ispagula. Подорожник Французький (Азіатський). Це трав'яниста рослина з роду Подорожник, яка росте в Індії та Ірані. У препараті використовується епідерміс та зруйновані суміжні шари, видалені з висушених зрілих зерен. Amla 1.0г.

Консервант: Sodium Methyl Paraben, Sodium Propyl Paraben.

Хімічні та поживні речовини: кальцій, вуглеводи (85 %), жири (3,5 %), залізо, фосфор, білок (1,5 %).

**Термін придатності:** 3 роки. Дата виготовлення вказана на упаковці.

**Виробництво:** Індія, Дабур