



АНТИКРИМ (ANTIKRIM, SAHUL) 30 КАПСУЛ

SKU: 0416

Ціна: 267 грн

Антикрім (Sahul) — аюрведична рослинна формула на основі відангу, бутеї, кампілаки, куркуми та холорхени. Містить біофлавоноїди та природні антиоксиданти. Підтримує травний комфорт та природні функції ШКТ.

Категорія: Баланс організму, Травлення та кишківник

АНТИКРИМ (ANTIKRIM, SAHUL)

Антикрім — аюрведична рослинна формула Sahul на основі відангу, бутеї, кампілаки, куркуми та холорхени. Традиційні аюрведичні рослини у складі цієї формули застосовуються в індійській народній медицині протягом століть. Містить біофлавоноїди та природні антиоксиданти. Формула підтримує травний комфорт та природні функції травної системи.

Властивості:

- Містить відангу (*Embelica ribes*) — традиційний аюрведичний рослинний інгредієнт;
- Містить бутею (*Butea monosperma*) — традиційну аюрведичну рослину. Містить флавоноїди бутрин, бутеїн та бутин;
- Містить куркуму — джерело куркуміноїдів та природних антиоксидантів;
- Підтримує травний комфорт та природні функції ШКТ;
- Джерело біофлавоноїдів та природних антиоксидантів;
- Традиційна аюрведична формула для підтримки здоров'я кишечника.

Ключові інгредієнти:

- **Відангу (*Embelica ribes*)** — традиційний аюрведичний рослинний інгредієнт. Містить ембелін та біофлавоноїди.
- **Бутея (*Butea monosperma*)** — традиційна аюрведична рослина. Містить флавоноїди бутрин (1,5%), бутеїн та бутин.
- **Кампілака (*Mallotus philippinensis*)** — традиційний аюрведичний рослинний інгредієнт.
- **Куркума (*Curcuma longa*)** — містить куркуміноїди та природні антиоксиданти.
- **Холорхена (*Holorrhena antidysenterica*)** — традиційний аюрведичний рослинний інгредієнт.

Спосіб застосування:

Дорослим — по 2 капсули перед сном протягом 14 днів. Повторний курс після 2-3 тижнів перерви або за призначенням лікаря.

Протипоказання:

Бутик ROSA - Аюрведичні товари преміум класу.

Київ, вул. Рейтарська, 7-А. Відкрито з 11:00 до 19:00 щодня.

Телефони: +380932173134, +380670070108, +380671600108.



Індивідуальна непереносимість компонентів. Не рекомендується під час вагітності та в період лактації. Не рекомендується при вираженому виснаженні. Перед застосуванням рекомендується консультація з лікарем.

*Не є лікарським засобом.